



# 営農サポート通信 第64号

平成29年6月 JA都城：営農サポーター（TAC）



Tとことん、A会って、Cコミュニケーション!!

## 里芋疫病対策(展着剤について)

里芋の疫病防除では、農薬と展着剤（スカッシュ）の混用をお願いしておりますが、里芋は展着剤だけでも薬害が発生することがあります。展着剤と農薬を混用した場合には、薬害の発生程度が変わることがありますので、注意が必要です。

強い日射で葉温が高い場合には、薬害が発生しやすいので、散布時間に注意してください。薬害を避けるためにも朝方もしくは夕方等の気温の低い時間帯に散布しましょう。

なお、急激な気温の上昇が予想される日は、朝方の散布は控えてもらうようお願いいたします。

## チョウ目害虫殺虫剤(甘藷)

同じ系統の薬剤を使い続けると薬剤抵抗性を持った害虫が発生しやすくなるので、異なる系統の薬剤でローテーションを組むように努めましょう。

### ファルコンフロアブル 規格 250ml

長い残効性！  
高い耐雨性！



#### 【脱皮促進作用】

本剤は幼虫の脱皮を急激に促進させます。幼虫は成長が追いつかず脱皮失敗で死亡します。(2~3日後には致死)

#### 【食害防止作用】

成分が体内に入ると、幼虫の生理状態は脱皮間近の状態に変わり食害が止まります。(10数時間後にはストップ)

#### 【ダブル・ヘッド・キャップ現象】

脱皮促進作用により、下図のような現象が見られる場合があります。脱皮後も、新頭部から前の頭殻が抜け落ちず口器がふさがれてしまいます。



【ダブル・ヘッド・キャップ現象】



甘藷での使用方法(10aあたり) 対象害虫：ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ  
希釈倍数：4,000倍(水100Lに薬剤25ml) 使用回数：3回 使用時期：3日前まで  
規格：250ml(250ml一本で1,000L分の薬液が作れます。)

※価格については、気軽にお尋ねください。商品は注文になる場合があります。

## 除草剤について

### ◆ザクサ液剤 規格 500ml 2L 5L 10L 20L

10L2本もしくは20L1本に500mlを1本添付いたします。20L規格はJA限定商品です。

### ◆バスタ液剤 規格 500ml 1L 5L 10L

豪華賞品が抽選で当たるバスタ30周年キャンペーンを開催しております。

各支所購買窓口に置いてあるキャンペーン専用はがきで応募できます。詳しくは各支所購買窓口にお尋ねください。

10L規格はJA限定商品です。

※価格については、気軽にお尋ねください。規格によっては注文になる場合があります。(キャンペーン期間は8月末までとなっております。)



## 農作業時の熱中症に注意

農作業中の熱中症による死亡事故は、毎年20件前後で推移しています。今年は、5月の真夏日においても近年で大変多い状況で、気象庁の3ヶ月予報(6~8月)では全国的に平均気温が高いとされています。こまめな水分補給、生産者同士での声かけ等を行い、熱中症予防に努めましょう。

#### ＜天気予報と体調をチェック＞

・急に暑くなる日は要注意です。体調不良時は無理をしないようにしましょう。

#### ＜こまめな水分補給と休憩＞

・喉が渇く前に、こまめに水分(塩分を含む物)を取り、涼しい場所で休憩しましょう。

#### ＜涼しい服装・安全な作業環境＞

・帽子で日差しを遮り、熱を逃がしやすい服装で。作業はできる限り2人以上で行いましょう。

**！高齢者は要注意！**高齢者は若者に比べ、暑さや喉の渇きを感じにくくなっています。周囲の人も積極的に声をかけましょう。



(農林水産省資料より抜粋)

(文書取扱：JA都城 営農サポーター) 事務所の電話番号は38-6693です

通信内容のご相談は営農サポーターまでご連絡ください