



営農サポート通信 第89号

令和元年7月 JA都城：資材課



里芋疫病対策

引き続き防除の徹底をお願いします。

現在、里芋疫病に農薬登録があるのは、ジーファイン水和剤とアミスター20フロアブルだけです。ジーファイン水和剤の予防散布は、疫病の発生を確実に遅らせます。発生を確認したらアミスター20フロアブルを7日間隔で2回散布します。発生が落ち着いたら、再びジーファイン水和剤を定期的に散布しましょう。

●アミスター20フロアブル●



作物	適用病害	希釈倍数	希釈水量	使用時期	使用回数	使用方法
里芋	疫病	2,000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布

●ジーファイン水和剤●

作物	適用病害	希釈倍数	希釈水量	使用時期	使用回数	使用方法
里芋	疫病	1,000倍	150~500L/10a	前日まで	-	散布

【薬剤散布のポイント】

●発生を確認したら、直ちにアミスター20フロアブルを連続散布すること。このためには、発生前にアミスター20フロアブルの使用回数（3回）を温存すること。

●台風で被害が拡大するので、台風前にジーファイン水和剤で予防しておくこと。

※他剤との混用は、薬剤によっては薬害を生じる恐れがありますのでご注意ください。

※亜リン酸資材とジーファイン水和剤は薬害が発生する恐れがありますので混用しないでください。

亜リン酸液肥について

いも肥大促進・つるボケ対策に『亜リン酸液肥』をお勧めいたします。

●エレマックス黄 (4-30-20) 【規格 1L・2.5ガロン (9.46L)】

●エレマックス赤 (0-28-26) 【規格 1L・2.5ガロン (9.46L)】

●ホスプラス (0-31-25) 【規格 1L・10L】

大型規格の購入がお得になっていますのでよろしくお祈いします。

【使用方法】

希釈倍数：1,000倍 使用時期・方法：10日おきに3回程度葉面散布

※1回の散布では、ほとんど効果は得られないので2回以上（3回程度）の散布をお願いいたします。最終散布を収穫の約1ヶ月前までに行ってください。

※アルカリ性農薬や石灰硫黄合剤、銅剤との混用は避けて下さい。ホルモン剤、カルシウム剤などの液肥との混用も避けてください。ホスプラスとジーファイン水和剤の混用はできますが、なるべく単品での使用をお願いします。



大型規格除草剤について

イネ科雑草除草剤の大型規格をご紹介します。

●ナフ乳剤 2L



作物	適用雑草名	使用時期	薬量 (10a)	水量	使用回数	使用方法
甘藷	一年生イネ科雑草 (スミカビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3~5葉期 収穫30日前まで	150~200ml	100~150L	1回	雑草茎葉散布又は全面散布
		雑草生育期 イネ科雑草 6~8葉期 収穫30日前まで	200ml	100L		

●ポルトフロアブル 2.5L

作物	適用雑草名	使用時期	薬量 (10a)	水量	使用回数	使用方法
甘藷	一年生イネ科雑草 (スミカビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3~10葉期 収穫14日前まで	200~300ml	100L	1回	雑草茎葉散布又は全面散布

大型規格での購入がお得になっていますのでぜひお買い求めください。

『ザクサ液剤』20L、『バスタ液剤』10L 規格も取り扱っていますのでご相談ください。

タッチダウンキャンペーン

タッチダウンIQ大型ボトルフェアのキャンペーンが7/31までとなっております。期間中購入でお得な特典がありますのでこの機会に購入をご検討ください。詳しくは最寄りの営農経済課、資材課渉外担当にお聞きください。

ジュースキャンペーン

塩日向夏 (490ml × 24本) 写真左

日向夏ウォータープラス (500ml × 24本) 写真中央

満潮の塩梅 (490ml × 24本) 写真右



対象期間: 7月31日(水)まで

通常価格 2,370円(税込) → 特別価格 2,000円(税込)

※商品は注文になる場合がありますのでご了承ください。

通信内容のご相談は営農サポーターまでご連絡ください

(文書取扱: JA都城 資材課)